

دليل المزارع

ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق
النباتات الأميركية وذباب صانعات الأنفاق
المتعرجة في أوراق النباتات وذباب صانعات
الأنفاق في أوراق الخضراوات

للخضراوات



النقاط الرئيسية



توجد الآن ثلاثة أنواع جديدة من ذباب صانعات الأنفاق في
الأوراق *Liriomyza* في أستراليا:
ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات الأميركية
(ASLM (*Liriomyza trifolii*))
ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات
(SLM (*Liriomyza huidobrensis*))
ذباب صانعات الأنفاق في أوراق الخضراوات
(VLM (*Liriomyza sativae*))

- ← تتغذى جميعها على العديد من النباتات ومن المحتمل أن تؤثر على معظم المحاصيل التجارية (بما في ذلك البطيخ والقرعيات).
- ← تم تسجيل الأضرار التي لحقت ببعض المحاصيل التجارية في ولايات كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والمقاطعة الشمالية وأستراليا الغربية وفيكتوريا.
- ← وتبين لنا التجربة المكتسبة من بلدان أخرى أن الإفراط في استخدام مكافحة الكيمائية سيأتي بنتائج عكسية.
- ← من المرجح أن تنجح مناهج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات في إدارة هذه الحشرات.

التوزع الحالي المعروف لذباب صانعات الأنفاق في الأوراق الجديدة اعتبارًا من عام 2023


ذباب صانعات الأنفاق
في أوراق الخضراوات
(تم اكتشافها لأول مرة في
Cape York عام 2015)



ذباب صانعات الأنفاق
المتعرجة في أوراق النباتات
(تم اكتشافها لأول مرة في حوض
سيدني عام 2020)




ذباب صانعات الأنفاق
المتعرجة في أوراق النباتات
الأمريكي
(تم اكتشافها لأول مرة بالقرب
من Kununurra عام 2021)




الموسمية

كل نوع جديد من أنواع ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق له ملاءمة مناخية مفضلة. تم إعداد النمذجة لإظهار أين ومتى من المحتمل أن يكون كل نوع في ذروة نشاطه.


ذباب صانعات الأنفاق في أوراق الخضراوات



ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق
النباتات



ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق
النباتات الأمريكي



المناطق الرئيسية

Mildura -M Bundaberg -B
Werribee -W Cairns -C
Kununurra -K



عدد الأيام في السنة مع نمو إيجابي متوقع¹

دورة حياة الحشرة

لدى ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق أربع مراحل لدورة الحياة

- تستغرق دورة حياة ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق النموذجية من 13 إلى 43 يومًا من وضع البيوض إلى ظهور الحشرات البالغة.
- يختلف الوقت المستغرق لإكمال كل مرحلة من مراحل الحياة حسب درجة الحرارة.
- تصبح معدلات التطور أسرع مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تدخل الأجيال.
- ومع ذلك، توجد حدود لدرجة الحرارة المميتة لكل نوع من أنواع ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق هذه:
 - ASLM 10 درجة مئوية و 35 درجة مئوية
 - SLM 5 درجة مئوية و 32 درجة مئوية - 35 درجة مئوية
 - VLM 10 درجة مئوية و 40 درجة مئوية

1 البيوض

تقوم الإناث البالغات بعمل ثقوب (نقط) عند التغذية و/أو وضع البيوض.

3 شرانق العذارى


ثم تشكل اليرقات شرانق العذارى، إما على الورقة أو في التربة.

2 اليرقات

تفقس هذه البيوض بعد 2-5 أيام وتقوم اليرقات بصنع نفق عبر الأوراق مما يخلق أنفاقًا متعرجة في الأوراق في الغالب على السطح العلوي للورقة. هذه هي المرحلة الأكثر ضررًا للخضروات.

4 الحشرات البالغة

ثم يخرج الذباب البالغ من شرانق العذارى ويتزاوج ويضع البيوض، وتبدأ الدورة مرة أخرى.



الآفات وتأثيرها

يمكن أن يتسبب التلف الناتج عن صنع الأنفاق في الأوراق والتغذية عليها في تساقط الأوراق قبل الأوان مما يؤدي إلى حروق الشمس في الفواكه، كما يخلق نقاطًا للعدوى الثانوية من الفطريات والبكتيريا.



أوراق الفاصولياء فيها أنفاق على نطاق واسع وعدوى ثانوية²



شرانق العذارى¹



صنع الأنفاق²



النقط²

قلق اقتصادي مرتفع



ذباب صانعات الأنفاق في أوراق الخضراوات¹
Liriomyza sativae

الورقة

البطيخ والفاصولياء والطماطم



ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات⁵
Liriomyza huidobrensis

الورقة

الكرفس واليقطين والكوسا والفاصولياء والبطاطس



ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات الأمريكية⁵
Liriomyza trifolii

الورقة

الأفحوان والفليفلة والبطيخ والبطاطس والفاصولياء

قلق اقتصادي منخفض



ذباب الفاصولياء⁴
Ophiomyia phaseoli

الورقة والساق

الفاصولياء الخضراء والبقوليات الأخرى



ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في البنجر³
Liriomyza chenopodii

الورقة

البنجر وحشيشة القزاز



ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في الأفحوان²
Chromatomyia syngenesiae

الورقة

التفاف وغيرها من النباتات النجمية



ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في الملفوف¹
Liriomyza brassicae

الورقة

الكرنب، مثل البروكلي والملفوف الصيني واللفت وغيرها

بعض ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق المستوطنة والمُنشأة حديثًا

موضع النفق

النباتات المضيفة الشائعة

1 حقوق الصورة: الدكتور إيليا بيرتل، سيزار أستراليا
2 حقوق الصورة: جون داف (وزارة الزراعة والثروة السمكية، كوينزلاند)
3 حقوق الصورة: بيتر ريدلاند، جامعة ميلبورن
4 حقوق الصورة: مختبر العلوم المركزي، يورك (بريطانيا)، التاج البريطاني
5 حقوق الصورة: الدكتور فريزل مديح ج تادل (وزارة الزراعة والثروة السمكية، كوينزلاند)

الأمن الحيوي للمزرعة



حقوق الصورة: جون داف (وزارة الزراعة والثروة السمكية، كوينزلاند)

كيف ينتشر

يُعتبر أن ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق البالغة يطير بشكل رديء عمومًا. السبب الأكثر احتمالاً للانتشار هو التنقل عبر البضائع والطائرات والمركبات ونقل المواد النباتية.

- قد تنتشر البيوض واليرقات عن طريق المواد النباتية الحية على سبيل المثال الزهور والخضروات الورقية المقصوفة
- قد تنتشر شرايق العذارى مع بقايا المحاصيل أو التربة أو تعلق على المواد النباتية عند الحصاد

فكر في أي منها ينطبق على أرضك



مراقبة ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق

- إجراء عمليات فحص بصرية للمحاصيل بانتظام، والبحث عن أضرار التنقيط أو حفر الأنفاق في الأوراق
- استخدام الفخاخ اللاصقة لمراقبة حشرات الذباب البالغة
- فحص الأوراق بصريًا للبحث عن الأنفاق واليرقات
- فحص أوراق وسيقان النباتات بحثًا عن شرايق العذارى التي التصقت بسطح النبات
- استخدام الصواني الموضوعة أسفل مظلات المحاصيل لمراقبة شرايق العذارى (لن يعمل هذا إلا مع محاصيل معينة)

منع الانتشار

تأكد من أن لديك خطة صارمة للأمن الحيوي تتضمن:

- اللافئات المناسبة
- محطات تعقيم الأحذية
- محطات تنظيف السيارات
- شراء المُدخلات الزراعية فقط من مصادر موثوقة أو معتمدة
- المراقبة والإشراف المنتظمين للمحاصيل
- رفض دخول أي شخص يرفض الامتثال لإجراءات الأمن الحيوي لديك



تعرف على المزيد

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا للحصول على دليل موجز لمراقبة ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في أستراليا



تعرف على المزيد

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا للحصول على معلومات حول كيفية الحفاظ على الأمن الحيوي الجيد في المزرعة



الإشراف الميداني




الفخاخ اللاصقة



محطات تنظيف السيارات

الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات

تمت معالجة نبات واحد فقط من نباتات الفاصولياء هذه بالمبيدات الحشرية، ولكن أي منها تمت معالجته قد يفاجئك! ¹



بدون الطفيليات، يمكن أن تنمو أعداد ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات بشكل كبير.

المبيدات الحشرية غير الانتقائية تُبِيد الدبابير الطفيلية ولكن لا تُبِيد كل ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات.

تكافح الدبابير الطفيلية بشكل طبيعي ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات.

تفشي ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق خارج أستراليا

تمت معالجة النبات الموجود على اليمين أسبوعيًا برش المبيدات الحشرية، لكنه تراكمت عليه أضرار جسيمة بعد العلاج. هذه مشكلة شائعة في الخارج، حيث يؤدي الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية غير الانتقائية وواسعة الطيف إلى تدمير الدبابير الطفيلية، والتي تعد أعداء طبيعية لذباب صانعات الأنفاق في الأوراق. يجب أن تعطي برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الأولوية للحفاظ على الطفيليات والنظر في جميع الاستخدامات الكيميائية في النظام.

أسس نهج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات

الرقابة الزراعية

راقب نشاط الآفات والطفيليات لاتخاذ قرارات مستنيرة للمكافحة.

الكيميائية

تجنب الاعتماد على المبيدات الحشرية، وخاصة المنتجات واسعة الطيف. وقد أدى ذلك إلى تطور مقاومة المبيدات الحشرية وتدمير مجموعات الحشرات النافعة المحلية. خذ بعين الاعتبار خيار المبيدات الحشرية الأكثر اعتدالاً.

الحشرات النافعة

حافظ على الأعداء الطبيعية النافعة مثل الطفيليات. تعرّف على علامات تطقل اليرقات في أنفاق الأوراق. اجمع شرائق العذارى لتحديد مستوى التطفل العذاري. ستشير علامات التطفل النشط إلى بعض المكافحة في تعداد مجموعات ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق.

المكافحة الكيميائية

طورت أنواع ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق مقاومة للعديد من المبيدات الحشرية. ومن الضروري اتباع نهج متكامل لمنع المزيد من المقاومة. إذا استخدمت المعالجات الكيميائية، فقم بتدوير المجموعات حسب طريقة التأثير وتجنب مبيدات الآفات واسعة الطيف. مبيدات الآفات ذات التأثير بالملامسة والجهازية والعبارة للطبقات فعالة في مراحل مختلفة. المكافحة الحيوية بالدبابير الطفيلية أكثر فعالية. تجنب الإضرار بمجموعات الدبابير المفيدة.

طرق تأثير المبيدات الحشرية ¹



العبارة للطبقات
المبيدات العبارة للطبقات فعالة ضد كل من الحشرات البالغة واليرقات



الجهازية
المبيدات الجهازية فعالة ضد اليرقات



بالملامسة
المبيدات ذات التأثير بالملامسة فعالة ضد الحشرات البالغة

رش المواد الكيميائية على أو في الأنسجة النباتية

نقوم ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات البالغة أو اليرقات

تجنب تفشي ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات عن طريق المراقبة خلال فترات الخطورة العالية واستخدام مواد كيميائية أكثر اعتدالاً. انظر الجدول صفحة 7.

المكافحة الطبيعية بواسطة الحشرات النافعة

دورة حياة الدبابير الطفيلية

تختلف دورة حياتها ويمكن تصنيفها على أنها "يرقات" أو "يرقات / شرانق العذارى".

اليرقات / شرانق العذارى¹

اليرقات¹



تضع أنثى الدبور بيضها على يرقة الذبابة أو داخلها.



تفقس بيضة الدبور وتتغذى على يرقة الذبابة. تظل بيضة الدبور خاملة حتى تخرج يرقة الذبابة وتتحول إلى شرنقة عذراء.




بعد تناول الذبابة، تتحول يرقة الدبور إلى شرنقة عذراء داخل نفق الورقة. تنشط بيضة الدبور في تناول عذراء الذبابة.



يخرج الدبور البالغ من نفق الورقة. يخرج الدبور من شرنقة الذبابة التي تبدو صحية.

ابحث عن علامات تطفل اليرقات داخل الأنفاق في الأوراق باستخدام عدسة يدوية (A و B). لن تظهر علامات التطفل لعذارى ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق التي تطفلت عليها يرقات/عذارى الدبابير إلا بعد ظهور الدبابير من عذارى ذباب صانعات الأنفاق التي تبدو صحية (C).



الدبابير الطفيلية أصغر بكثير من دبوس التثبيت.

الدبابير الطفيلية

الدبابير الطفيلية هي طريقة طبيعية لمكافحة ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق. يمكن أن تصل الدبابير الطفيلية إلى يرقات ذباب صانعات الأنفاق داخل الورقة، وتضع بيوضها على اليرقات أو فيها. وتسبب نفوقها من خلال التطفل أو عن طريق التغذية المباشرة على يرقات ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق النامية. يمكن أن تصل معدلات النفوق الميدانية إلى 80%.

يوجد في أستراليا ما لا يقل عن 50 نوعًا من هذه الدبابير التي تهاجم الآفات المحلية والغريبة. أربعة منها جيدة بشكل خاص في استهداف ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق:

الدبابير الطفيلية الرئيسية التي تهاجم صانعات الأنفاق في الأوراق¹

Opius spp.

- طفيلي اليرقات / شرانق العذارى
- مسجل وجوده في جميع الولايات
- تهاجم ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من هذا الجنس ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق الأصلية في أستراليا



Diglyphus isaea

- طفيلي اليرقات
- موجود في جنوب شرق أستراليا (ولكن من المحتمل أن يكون حديثًا فقط)
- يُربى على نطاق واسع في الخارج للمكافحة الحيوية



Hemiptarsenus varicornis

- طفيلي اليرقات
- مسجل وجوده في جميع الولايات
- مصدر مهم للمكافحة في الخارج
- المستغل المبكر لذباب صانعات الأنفاق في الأوراق الغريب الجديد



Zagrammosoma latilineatum

- طفيلي اليرقات
- مسجل وجوده في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفكتوريا وأستراليا الغربية والمقاطعة الشمالية
- المصدر الرئيسي لمكافحة ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في أقصى شمال كوينزلاند
- لا يُعرف إلا القليل عن بيئتها وخصائصها الحيوية



تصاريح الاستخدام البسيط المتاحة لذباب صانعات الأنفاق في الأوراق ⁺ (Liriozya) ^٧ التمتع فقط ^٨ التصريح الحالي ^٩ FC يجب إتلاف المحاصيل حماد الحقل فقط

المادة الفعالة	Chlorantraniliprole	Gyromazine	Chlorantraniliprole	Gyrantraniliprole	Spirotetramat	Spirosad	Spiroxoram	Spiretoram	Abamectin	Emamectin Benzoate	Dimethoate	Thiamethoxam Chlorantraniliprole
طريقة التأثير	17	28	28	28	23	5	5	5	6	6	1B	29g 4B
النشاط	عابر للطبقات	جهازي	جهازي	جهازي	جهازي وعابر للطبقات	بالاممسة وجهازي	بالاممسة وعابر للطبقات	بالاممسة وعابر للطبقات	بالاممسة وعابر للطبقات	عابر للطبقات	بالاممسة وجهازي	جهازي
مثال على المنتج	Diptex 150WP PER81867	Coragen PER87631	Benevia PER93849	Benevia PER93850	Momento 240 SC PER88640	Entrust PER94331	Success Neo PER87878	Success Neo PER94451	Veritime PER81876	Warlock PER87563	Dimethoate 400 PER89184	PER94452
رقم التصريح	2026/09/30	2029/03/31	2026/12/31	2026/12/31	2026/02/29	2026/04/30	2027/12/31	2027/07/31	**2024/04/30	2029/03/31	2025/03/31	2026/06/30
تاريخ الانتهاء	منخفض	منخفض	منخفض	منخفض	منخفض إلى معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	مرتفع	مرتفع
التأثير على الحشرات الآففة بما فيها الطفيليات الملتصبة ^{١٠}	منخفض	منخفض	منخفض	منخفض	منخفض إلى معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	مرتفع	مرتفع
البروكلي	✓								○	○		
تُحلبات الرصل									○	○		
تُحلبات الخضروات		✓							○	○		
الملفوف الأراس)	✗								○	○		
الفليفلة والبطاطس الحار		✓				✓			○	○		
الكرفس					○ حصاد الحقل				○	○		
الذرة			✓						○	○		
أعشاب الطهي	✓								○	○		
القرعيات			✓						○	○		
البلانجان			✓						○	○		
الخضروات المجمدة ^{١١}	✓		✓						○	○		
البازلاء النخلة والبرازء السكرية	✓				○ حصاد الحقل				○	○		
الفاصولياء الخضراء	✓								○	○		
البرازء الخضراء	✓								○	○		
الكرفس الورقي	✗								○	○		
الخضار الورقية ^{١٢}	✗								○	○		
الخضروات البقولية	✓								○	○		
الخس الأراس)	✓				○ Leafy Inc				○	○		
البقدونس			✓						○	○		
البطاطس									○	○		
البقول	✓								○	○		
الارزوند	✓				○ حصاد الحقل				○	○		
الخضروات الجذرية والدرنية	✓								○	○		
اسنق والسبانخ	✗								○	○		
الخضروات الساقية والخضعية	✓								○	○		
الطماطم			✓		○				○	○		

^{١٠} يشير القمع إلى مستوى من الفعالية أقل من الفعالية أقل من الفعالية الكاملة
^{١١} الكافور وكلمة لا يزال ذا فائدة الفعالية
^{١٢} قيد المراجعة من قبل الهيئة الأسترالية للمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية (APVMA). المرفوضي حذوران / يونيو 2024

^١ ساي اعتباراً من تاريخ النشر
^{*} باستثناء الفروع أو الذرة أو الطر
[#] باستثناء الفروع أو الذرة أو الطر
⁺ باستثناء الحس

إحدى المسؤولية هنا دليل مرجعي سريع ويهدف بعض العناصر المدرجة في تصاريح الاستخدام البسيطة. مثل الروابط الفعالية والعمود لم يدل على عدم توفير المعلومات الأكثر اكتمالاً وحداثة اعتباراً من تاريخ النشر. ومع ذلك، نوصي بالتحقق من التفاصيل المحددة على موقع APVMA الإلكتروني في الروابط المفصلة.

قيود التجارة والنقل

توجد حاليًا قيود على النقل للحد من انتشار ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق في أستراليا. يتم تحديث لوائح التجارة بين الولايات بانتظام. تحقق دائمًا من أحدث المعلومات مع وزارة حكومة الولاية ذات الصلة.

متطلبات الإبلاغ

بعض الولايات القضائية لديها متطلبات قانونية للإبلاغ عن اكتشاف ذباب صانعات الأنفاق في الأوراق. يمكنك الإبلاغ عن الآفات عن طريق الاتصال بالخط الساخن للآفات النباتية الغربية على الرقم 1800 084 881

الولاية	VLM (ذباب صانعات الأنفاق في أوراق الخضراوات)	SLM (ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات)	ASLM (ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات الأمريكي)
نيو ساوث ويلز	يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه
المقاطعة الشمالية	يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه
جنوب أستراليا	يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه
كوينزلاند	يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه
تسمانيا	لا يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه
فيكتوريا	يمكن الإبلاغ عنه	لا يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه
أستراليا الغربية	يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه	يمكن الإبلاغ عنه

أقصى شمال كوينزلاند

ذباب صانعات الأنفاق في أوراق الخضراوات هي آفة معلن عنها في أقصى شمال كوينزلاند ومقيدة بقيود النقل في أقصى شمال مناطق الأمن الحيوي.



أستراليا الغربية

يتم تقييد نقل المواد في ولاية أستراليا الغربية التي يمكن أن تحمل ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات الأميركي من مقاطعات Derby West و Broome و Wyndham-East Kimberley و Kimberley إلى بقية الولاية.



بغض النظر عن المتطلبات القانونية في منطقتك، إذا كنت تشك في وجود آفة غير معروفة حاليًا في منطقتك، فيرجى التقاط صور للآفة والاتصال بالخط الساخن للآفات النباتية الغربية على الرقم 1800 084 881



مصادر أخرى

إدارة مكافحة ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات

يتوفر دليل أكثر تعمقًا لإدارة مكافحة ذباب صانعات الأنفاق في أوراق النباتات هنا.



شكر وتقدير

استراتيجية إدارة مكافحة ذباب صانعات الأنفاق المتعرجة في أوراق النباتات، (*Liriomyza huidobrensis* (MT20005)) هي استثمار استراتيجي في إطار صناديق Hort Innovation للخضروات والبطاطس - الطازجة والبطاطس - المعالجة والبصل والبطيخ.

تم تمويل هذا المشروع من قبل Hort Innovation باستخدام رسوم البحث والتطوير الخاصة بالخضروات والبطاطس والبصل والبطيخ والمساهمات المقدمة من الحكومة الأسترالية. Hort Innovation هي شركة بحث وتطوير مملوكة للمزارعين وغير هادفة للربح للبيستنة الأسترالية.

تم تمويل ترجمة هذه الوثيقة في إطار برنامج التعافي من العواصف والفيضانات، والذي تم تمويله بشكل مشترك من قبل حكومتي أستراليا ونيو ساوث ويلز.

